

QUALI SONO LE COMPLICANZE E GLI EFFETTI COLLATERALI DEL BENDAGGIO GASTRICO REGOLABILE?

A BREVE TERMINE DOPO L'INTERVENTO

Perdita di liquidi dal bendaggio gastrico	<p>Può verificarsi una piccola rottura nella camera pneumatica del bendaggio o nel catetere di collegamento con la porta di iniezione della soluzione salina.</p> <p>Questa rottura può causare la perdita di liquido di regolazione del bendaggio gastrico (soluzione fisiologica o iopamidolo 200).</p>
Infezione o dislocazione della porta di iniezione del liquido	<p>La porta di iniezione del liquido può dislocarsi o può svilupparsi un'infezione.</p>
Dilatazione della tasca gastrica	<p>Se il soggetto obeso continua a mangiare in modo eccessivo le pareti della tasca gastrica possono ingrandirsi in modo evidente rendendo vano l'intervento.</p>
Nausea e vomito	<p>Nausea e vomito subito dopo l'intervento di chirurgia bariatrica non sono infrequenti ma in genere non sono sintomi preoccupanti. Le cause della nausea possono essere diverse: disidratazione, trattamento del dolore, somministrazione di vitamine e dimensioni della tasca gastrica. Il vomito può essere provocato dal consumo di quantità eccessive di cibo, da una masticazione non sufficiente oppure da un ritmo nel mangiare troppo accelerato.</p>
Stitichezza (stipsi)	<p>L'insorgenza di stipsi è un evento frequente dopo un intervento di bendaggio considerati l'elevato apporto di proteine, la riduzione di assunzione di frutta e verdura e il trattamento antidolorifico nel primo periodo post-operatorio.</p> <p>E' importante evitare in questa fase l'assunzione di lassativi a base granulare o di semi o masse compatte.</p>
Ostruzione del passaggio di cibo e di liquidi	<p>Il canale di passaggio del cibo e dei liquidi può diventare troppo stretto a seguito dello scivolamento del bendaggio o nel caso di bocconi troppo grandi per masticazione non sufficiente.</p>
Infezione di ferite o cellulite	<p>Possono essere conseguenti a procedure di chirurgia in aperto.</p>

A LUNGO TERMINE DOPO L'INTERVENTO

Perdita di liquidi dal bendaggio gastrico	<p>Può verificarsi una piccola rottura nella camera pneumatica del bendaggio o nel catetere di collegamento con la porta di iniezione della soluzione salina.</p> <p>Questa rottura può causare la perdita di liquido di regolazione del bendaggio gastrico (soluzione fisiologica o iopamidolo 200).</p>
Dilatazione della tasca gastrica	<p>Se il soggetto obeso continua a mangiare in modo eccessivo le pareti della tasca gastrica possono ingrandirsi in modo evidente rendendo vano l'intervento.</p>
Migrazione del bendaggio	<p>Il bendaggio gastrico può migrare nello stomaco o nell'intestino a seguito di un'infezione.</p>
Scivolamento del bendaggio	<p>Il bendaggio può scivolare dalla posizione prevista.</p>