DIFFERENZE TRA DIABETE DI TIPO 1 E DIABETE DI TIPO 2

Caratteristiche	Diabete ti tipo 1	Diabete di tipo 2
INCIDENZA	~ 10% diabetici	~ 90% diabetici
ETÀ DELL'ESORDIO	In genere prima dei 30 anni (picchi in età prescolare e pubertà/adolescenza)	In genere dopo i 40 anni
FATTORI DI RISCHIO	Non noti	Familiarità/predisposizione, **obesità**, vita sedentaria, dieta sbilanciata, **ipertensione**, **dislipidemie**
SINTOMI	Esordio rapido, brusco Sempre presenti e spesso eclatanti	Esordio lento Spesso assenti o modesti
TENDENZA ALLA CHETOSI	Presente.	Assente
PESO CORPOREO	**Generalmente normale**	**Generalmente presenza di sovrappeso o obesità**
COMPARSA DI COMPLICANZE CRONICHE	Non prima di alcuni anni dopo la diagnosi	Spesso già presenti al momento della diagnosi
INSULINA CIRCOLANTE	Ridotta o Assente	Tendente all'aumento
AUTOIMMUNITA'	Presente (diverse evidenze lo indicano come malattia autoimmunitaria)	Assente (nessuna evidenza)
SCREENING PER DIAGNOSI PRECOCE	Ricerca di autoanticorpi	Glicemia a digiuno Glicemia dopo prova da carico
TERAPIA	Insulina necessaria sin dall'esordio (In rari casi trapianto)	Dieta, esercizio fisico, farmaci orali. Insulina solo nei casi di insuccesso dei precedenti e in diabete più avanzato.

"Fonte: Standard Italiani del Diabete, 2011"